

訂正

- ・2015年4月号(総説5 竹中 祐子 先生)論文内(p.412, 413)に誤表記がありました。
読者および関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びするとともに、以下に訂正いたします。

- ・p.412 表5 活性型ビタミンD₃外用薬, 保険適応

・タカルシトールおよびマキサカルシトールの使用量が70 g/週となっております。正しくは10 g/日となります。
 ・マキサカルシトールの掌蹠膿疱症についての保険適応が×となっております。正しくは○となります。
 下記に訂正した表を掲載いたします。

表5 活性型ビタミンD₃外用薬, 保険適応 (文献6より転載, 一部改変)

一般名	タカルシトール	タカルシトール	カルシポトリオール	マキサカルシトール
商品名(®)	ボンアルファ	ボンアルファハイ	ドボネックス	オキサロール
濃度	2 μg/g	20 μg/g	50 μg/g	25 μg/g
剤型	軟膏 クリーム ローション	軟膏 ローション	軟膏	軟膏 ローション
使用量	制限なし	10 g/日	90 g/週	10 g/日
保険適応疾患				
尋常性乾癬	○	○	○	○
毛孔性紅色秕糠疹	○	×	×	×
掌蹠膿疱症	○	×	×	○
掌蹠角化症	○	×	×	○
魚鱗癬群	○	×	×	○

- ・p.413 本文 左段2行目から9行目まで

(誤)

適応は尋常性乾癬のみで、1日1回の外用で使用量は70 g/週までの上限がある。ドボネックス®軟膏の保険適応は尋常性乾癬のみである。灼熱感などの刺激症状が現れることがあり、顔面には使用しない。1日2回の塗布で90 g/週まで使用できる。オキサロール®には軟膏とローションの2型があり、尋常性乾癬、掌蹠角化症、魚鱗癬群の3疾患に適応をもつ。1日2回塗布で使用量は70 g/週を上限とする。

(正)

適応は尋常性乾癬のみで、1日1回の外用で使用量は10 g/日までの上限がある。ドボネックス®軟膏の保険適応は尋常性乾癬のみである。灼熱感などの刺激症状が現れることがあり、顔面には使用しない。1日2回の塗布で90 g/週まで使用できる。オキサロール®には軟膏とローションの2型があり、尋常性乾癬、**掌蹠膿疱症**、掌蹠角化症、魚鱗癬群の**4**疾患に適応をもつ。1日2回塗布で使用量は**10 g/日**を上限とする。

訂正

・ 2015 年 4 月号 (総論 石黒 直子 先生) 論文内 (p.378 表タイトル) に誤表記がありました。以下に訂正いたします。

(誤)

表 キャリア継続のための学習目標—女性医師のキャリア支援のために— (案)
(日本医学教育学会 女性医師キャリア教育検討委員会 作成, 文献 6 に内容後, 掲載予定)

(正)

表 キャリア継続のための学習目標—女性医師のキャリア支援のために— (案)
(日本医学教育学会 女性医師キャリア教育検討委員会 作成, 文献 6 に内容確認後, 掲載予定)

・ 2015 年 4 月号 (総論 石黒 直子 先生) 論文内 (p.379 文献 6) に誤表記がありました。以下に訂正いたします。

(誤)

6) 石黒直子 : 医学教育 46: 2015 に掲載予定

(正)

6) 日本医学教育学会 女性医師キャリア教育検討委員会 : 医学教育 46: 2015 に掲載予定