本書の構成

7章

コンソリデーション

4 コンソリデーション内部に高吸収, 低吸収値を示す病変

窪田真希子

Key Points of Differential Diagnosis

コンソリデーション内部に高吸収, 低吸収値をみたらどう考えるか?

- 縦断条件で高吸収, 低吸収を含む疾患は多くはなく, 非常にキーとなる所見である。
- 高吸収では, ヨードや石灰化, 出血などを病態を考える。
- 低吸収では, 液体貯留や水の吸収値, 脂肪の吸収値を呈す病態を考える。

コンソリデーション内部に高吸収, 低吸収値を示す病変の解説

コンソリデーションやびまん性肺炎では, 肺野条件での分布や形状, 既存病変との関係などの所見を主体に診断されることが多い (p.165-168 [7章・巻頭] 参照)。しかし, 縦断条件での特徴, すなわち高吸収や低吸収の所見を認めた場合は, その疾患の特徴をとらえていることが多く, コンソリデーションの鑑別診断として非常に重要である。必ず縦断条件を確認してほしい。

コンソリデーション内部に高吸収を示す鑑別疾患

- 1 アミオダロン肺障害 amiodarone pulmonary toxicity** **III**

抗不整脈薬のひとつであるアミオダロンによる薬毒性肺障害である。肺障害は約5%だが, 時に致死的となるため重要である。病型には慢性間質性肺炎, DAD (diffuse alveolar damage) パターン, OP (organizing pneumonia) パターンなどがある¹⁾。アミオダロンはヨードを含有的ため, 肺障害の病変や肝実質などに沈着し, CTで高吸収を呈すのが特徴的である。
- 2 出血 hemorrhage**

肺腫瘍に伴う出血, びまん性肺出血 (diffuse alveolar hemorrhage : DAH) **III**, その他様々な原因による出血によって, 肺野にコンソリデーションを来すことがある。原因ははっきりしない多発コンソリデーションで, 出血後の鑑影のタイミングにもよるが, 淡い高吸収を認めた場合に肺出血を疑うきっかけになる。その場合は, 腎臓として血管炎の可能性もある。ただし, 軽度な高吸収のことが多い。このため, ベースメーカーなどの金属, 上肢の舉上不可, 止血剤不良などのアーチファクトによる高吸収を鑑別しないように注意が必要である。
- 3 アレルギー性気管支肺真菌症 allergic bronchopulmonary mycosis : ABPM** **III**

喘息と末梢血の好酸球増多を伴う, アスペルギルス抗原への過敏性反応だが, 他の真菌でも認

められる, 中枢性の気管支拡張後に粘着貯留を伴い, この粘着貯留は約1/4でカルシウム塩や, 鉄やマンガンなどの金属イオンなどにより高吸収 (high attenuation mucus : HAM) を呈す²⁾。拡張した気管支の粘着貯留のみを認める場合も他, コンソリデーションを伴い繰り返す肺炎として加味されているケースもある。気管支内の高吸収粘着貯留を疑う所見を認めた場合は, 診断的価値が高い。

- 4 転移性肺石灰化症 metastatic calcification** **III**

異所性石灰化とも呼ばれる。高カルシウム血症により, 正常な肺組織へのカルシウム沈着を起す。最も多い原因は慢性腎不全に対する血液透析で, 原発性副甲状腺機能亢進症などでも認められる。上肺野に好発し, これは肺動脈では換気血流比が高いことが影響している³⁾。骨シンチグラフィで集積することも知っておきたい。
- 5 その他の鑑別**

肺動脈石症などが挙げられる。

症例1 40代, 男性 特発性拡張型心筋症の治療中, 胸部単純X線写真で異常影を指摘。

図1 アミオダロン肺障害

A: 胸腺下や縦断胸腺下に沿った非区域性のコンソリデーションを認め, OPパターンを呈している。
 B: 病変は高吸収を呈している (→)。
 C: 肝もびまん性高吸収を呈している。
 経過: 不整脈に対し高用量のアミオダロン投与中であり, 画像所見よりアミオダロン肺障害と診断された。休薬により経過観察CTで改善が認められた。
 縦断条件でコンソリデーション内に高吸収を含み, 肝臓においてびまん性高吸収が強いことに気づくのがポイントで, 既往がはっきりしない場合でも, アミオダロン服用の有無を確認する。

本項の所見が示す意味や鑑別の進め方を, 冒頭に箇条書きで簡潔にまとめています。

本文では, 所見に関してより具体的に解説します。その後, 同所見を示す疾患を common なものから順に挙げて解説します。同所見においてやや rare な疾患は最後にまとめています。

本項の所見を示す典型的症例を中心に, 多数の画像を掲載しています。

図2 新型コロナウイルス肺炎
 胸腺下にすりガラス影やコンソリデーションあり, 拡張した比較的大いしべルの気管支が, 胸壁近くに認められており (→), 吸収性変化を伴っていることが推察される。

図3 乳癌術後放射線治療後の肺気腫肺炎
 胸腺下を中心に, 右下葉と中葉にまたがって広がる非区域性のコンソリデーションやすりガラス影を認める。胸腺下に気管支拡張 (→) がみられる。
 経過: 臨床所見や血液検査からには細菌性肺炎を疑う所見に乏しく, 乳癌術後の放射線治療後の二次性肺気腫肺炎と診断された。照射された胸腺下を中心に認められることが多く, コンソリデーションが比較的内に連続して認められることも多い⁴⁾。

症例5 50代, 男性 縦断条件にて胸部, 診断書として検査するも, 縦断条件で異常が確認。

図4 結核のない皮膚病変に伴う急速進行性間質性肺炎 (cicatricial amyopathic dermatomyositis : CADM)
 下肺野末梢部位にコンソリデーションやすりガラス影を認め, 6日間のCT (非提示) より病変の範囲が増進し, コンソリデーションが増進した。コンソリデーション内には気管支拡張 (→) がみられ, 下肺野の容積減少も認められる。
 経過: 本症例では間質性肺炎に対して治療を行ったが, 約10日後に死亡との転帰となった。

症例6 80代, 男性 縦断条件にて胸部, 縦断条件で異常影を指摘, 縦断条件で異常影を指摘。

図5 急性呼吸器症候群 (ARDS)
 びまん性すりガラス影, crazy-paving appearance, わずかにコンソリデーションやすりガラス影を認め, 縦断条件で気管支拡張 (→) がみられる。

参考症例 70代、男性 1か月前より全身倦怠感、食欲不振が出現。胸部単純X線写真にて異常影を指摘され紹介。血液所見で強い炎症反応の上昇あり。

HRCT

12D 多発性多発性肉芽腫性肺炎 (GPA)
右上葉肺門下部位に非辺縁性のコンソリデーションと若干のびり入り影を認める。大動脈弓周囲の上左肺野にもコンソリデーションがみられる(→)。
経過：本症例は抗感染薬治療でも、病変および臨床所見の増悪を認めた。気管支鏡下生検が実施され、病理所見がPPFD、ANCA陽性となり診断された。ステロイド/免疫抑制薬投与が治療法として改訂された。
GPA肺野病変では、結節や腫瘍を呈することが多く、時に空室を伴うが、本症例のようにコンソリデーションを呈することがある。コンソリデーションは肺萎縮、高気化肺炎、肺動脈出血を示すとされる⁹⁾。

8) 参考文献

- 1) Suzuki Y, et al. Emphysematous pneumonia: a review of the previous literature, causes, diagnosis, and management. *Allegrol Int* 68: 413-419, 2019.
- 2) 田中伸幸. 肺炎病: 病理と治療. *レジデントワーク* 24: 212-221, 2022.
- 3) 松田浩志. COVID-19肺炎. *臨床呼吸器* 38: 368-376, 2022.
- 4) Keith SW, et al. Clinical characteristics of patients with pulmonary infarction: a retrospective review. *Respir Med* 139: 13-18, 2018.
- 5) Martinez F, et al. Common and uncommon manifestations of Wegener granulomatosis at chest CT. *radiologic-pathologic correlation. Radiographics* 32: 51-69, 2012.
- 6) Johkoh T, et al. Usefulness of high-resolution CT for differential diagnosis of multi-focal pulmonary consolidation. *Radiat Med* 14: 139-146, 1996.
- 7) Anzari-Gilani K, et al. Chronic airways disease: review of the causes and key computed tomography findings. *World J Radiol* 12: 29-47, 2020.
- 8) 田中伸幸. 肺. 上野野に多い病変. *下野野に多い病変*. 解題と病変から学ぶ呼吸器画像診断. *呼吸器病* 40: 466-474, 2020.
- 9) 原田裕光. 肺動脈: 肺動脈の病変分布. 解題と病変から学ぶ呼吸器画像診断. *呼吸器病* 40: 476-485, 2020.

8 多発コンソリデーションの鑑別診断表とめ

	疫学・臨床所見その他	CT	その他
細菌性肺炎	• 肺動脈炎、気管支肺炎 • 肺萎縮合併の時に注意	• コンソリデーション、すりガラス影、気管支拡張像、小葉中心性陰影、肺水腫など	—
肺動脈肺炎	• 肺動脈に由来する	• 肺下葉を中心とした肺野前部肺野、コンソリデーション、すりガラス影、胸動脈中核部の気管支影の肥厚や結核性小葉中心性陰影	—
非結核性抗酸菌肺炎 (NTM)	• MACが最も多く、約90%を占める	• コンソリデーション、空泡、気管支拡張像、小葉中心性陰影や結核が典型像	—
肺水腫	• 心原性肺水腫、非心原性肺水腫	• 内帯優位のコンソリデーション、すりガラス影、小葉周囲縁の肥厚などリンパ管性陰影の肥厚	• 肺動脈X線写真・縦断陰影(Kerley's line、陰影の改善確認が望ましい)
特異性器管炎肺炎 (COP)	• OPで原因不明のもの • 悪性の経過が多い	• 多発性、中下肺野優位、胸動脈の非区域性分布、気管支血管束内分布、コンソリデーション、すりガラス影、CT halo sign、reversed halo sign	• 陰影の自然消退や移動
慢性好酸球性肺炎 (CEP)	• 肺動脈の約半数、男性より女性が多い • 多くの場合、末梢血中で好酸球増加	• 典型的には上中肺野優位に分布し、胸動脈下区域性のコンソリデーションやすりガラス影などCOPとよく似た像	• 肺動脈X線写真・典型的には「The photographic negative of pulmonary edema」
薬剤性肺炎	• 薬剤投与と関連する肺萎縮 • 他の病変が除外されることが多い	• びまん性にすりガラス影、コンソリデーション、肺動脈影がみられることが多い • OPパターンが強い • DAD(ターペル)予後不良	—
膠原病に伴う肺萎縮	• OPパターンは関節リウマチや硬皮症、皮膚病変と比較的認められる	• 肺萎縮はCOPと同様 • 肺動脈影の増大や肺動脈影には予後不良な抗MDA-5抗体陽性の間質性肺炎に注意が必要	—
COVID-19肺炎	• 新型コロナウイルスSARS-CoV-2による肺炎	• すりガラス影、crazy-paving appearance、コンソリデーション、Vascular enlargement • コンソリデーションは約1週間前後からみられる	—
肺萎縮	• 肺動脈の合併症 • 肺動脈と気管支影の二重影がみられるため、必ずしも肺萎縮の起こるわけではない	• 肺動脈に影を呈する楔状・放射状、コンソリデーション、すりガラス影、reversed halo sign、feeding vessel sign	• 肺動脈X線写真・Hampton hump sign(胸動脈を拡大したコンソリデーションが肺動脈に向かってC状を呈す表現)
肺出血	• 肺動脈(腎臓に血行した)に注意、その他の原因により出血がみられる • 肺動脈陰影(肺動脈陰影)	• コンソリデーション、すりガラス影、境界不明瞭な楔状・放射状陰影(出血の量などにもよる)、強い低吸収区(縦断像)	—
液性陰影と肺動脈陰影 (IMA)	• 豊富な粘液産生を来す肺萎縮で結核菌感染を引き起こす	• コンソリデーション、すりガラス影、小葉中心性陰影、気管支拡張像、結核菌による低吸収(縦断像)、bulging fissure sign	—
サルコイドーシス	• 非結核性肺炎と免疫性肺炎 • 無菌性肺炎	• 両肺野門・縦断像(腫大、微細陰影放射状影) • リンパ管影、galaxy sign、コンソリデーション、慢性化、縦断像・放射状影、牽引気管支拡張像	• 肺動脈X線写真・BHL1と2 sign • GaシンチグラフィやFDG-PETで集積
その他の感染症	• 結核、クリプトコックスやマニフィエスチス症など真菌性肺炎、真菌性肺炎など	• 両肺野門・縦断像(腫大、微細陰影放射状影) • リンパ管影、galaxy sign、コンソリデーション、慢性化、縦断像・放射状影、牽引気管支拡張像	—

その他の鑑別：急性好酸球性肺炎(AEP)、胸腺腫実質細胞腫瘍症(PFPE)、肺動脈炎、多発性多発性肉芽腫性肺炎(GPA)、好酸球性多発性肉芽腫性肺炎(EGPA)、IgG4関連性リウマチ(慢性性陰影、リボイド肺炎、肺萎縮、放射線肺炎など)
* FDG-PETの保険適用は心サルコイドーシスのみ。

●肺野の慢性化変化・気管支拡張を伴うコンソリデーション

MEMO 臨床経過の追加に注意：縦断像上による慢性化変化

【図7】では、右下部に「気管支拡張を伴うコンソリデーションがあるように見え、一見すると「肺動脈炎を疑う」と判断してしまうかもしれない。しかし、縦断に造影より高位に位置する右肺野(【図7】*)が鍵で、これは右肺野肺動脈に伴う慢性化変化である。横断像での病変像の真の真の判別は、最も難しく感じられるかもしれないが、スクラト像【図7】や縦断像を鑑別することで、横断に異がつきやすくなる。縦断と横断を連ねるために、本稿の縦断の慢性化変化、気管支拡張などの他に、このような縦断像の判別に注意を要する。

【図7】右肺野肺動脈上による慢性化変化(矢印)

8 気管支拡張を伴うコンソリデーションの鑑別診断表とめ

鑑別点	細菌性肺炎	肺動脈肺炎	非結核性抗酸菌肺炎 (NTM)	肺水腫	特異性器管炎肺炎 (COP)	慢性好酸球性肺炎 (CEP)	薬剤性肺炎	膠原病に伴う肺萎縮	COVID-19肺炎	肺萎縮	液性陰影と肺動脈陰影 (IMA)	サルコイドーシス	その他の感染症
鑑別点	• 慢性好酸球性肺炎、胸腺腫実質細胞腫瘍症(PFPE)、異形性石灰化、二次性結核、アミオロシ病 など	• 肺動脈炎、放射線治療後、薬剤性肺炎など	• 肺動脈炎、放射線治療後、薬剤性肺炎など	• 心原性肺水腫、非心原性肺水腫	• 慢性好酸球性肺炎、慢性好酸球性肺炎、慢性好酸球性肺炎	• 慢性好酸球性肺炎、慢性好酸球性肺炎							

8 参考文献

- 1) Marshall GL, et al. Signs in thoracic imaging. *J Thorax Imaging* 21: 76-90, 2006.
- 2) Walker CM, et al. Imaging pulmonary infection: classic signs and patterns. *AJR* 202: 479-492, 2014.
- 3) 西井文昭. 肺. 感染. または肺動脈炎(肺動脈炎). *呼吸器病* 38: 472-481, 2013.
- 4) Beardsley R, et al. Fibrotic organizing pneumonia. *J Clin Pathol* 66: 872-881, 2013.
- 5) Wazawa Y, et al. Chest computed tomography findings of adult patients with antinuclear autoantibody-associated pulmonary disease. *Mod Rheumatol* 32: 360-372, 2022.
- 6) Ishikawa K. High-resolution computed tomography findings of acute respiratory distress syndrome, acute interstitial pneumonia, and acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis. *Semin Ultrasound CT MR* 35: 39-46, 2014.
- 7) Kano A, et al. Radiographic and CT features of radiation-induced organizing pneumonia after breast-conserving therapy. *Am J Radiol* 20: 128-136, 2011.

やや稀な鑑別疾患や、common疾患の非典型像などを「参考症例」として紹介しています。

所見からの鑑別診断に役立つフローチャートを入れている項もあります。

鑑別診断表として、鑑別に有用なポイント・エッセンスをまとめ直しています。

本項における用語解説、ピットフォール、知っておきたい豆知識などを盛り込んでいます。